



EFIKA^{sol}

FERTILISATION AGRONOMIQUE

TH1110

À base de
Trichoderma harzianum THM 308
AMM MFSC n°1190493



COMPOSITION

Micro-organismes vivants:

Trichoderma harzianum 2% ou 1.10^4 CFU.g⁻¹)

MATIÈRE D'ORIGINE VÉGÉTALE

maltodextrine (98%), Substances organiques (Corg): 97%

CONDITIONNEMENT

Pot de 1 kg / Carton de 6 pots

DOSAGE

200 à 500 grammes par hectare (selon cultures)

STOCKAGE

Dans un environnement frais (4° à 20°), sec, ventilé
et à l'abri de la lumière directe du soleil

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois à compter de la date de production

Contactez votre technicien pour connaître les conditions
d'utilisation et les précautions d'emploi



EFIKA^{sol}

FERTILISATION AGRONOMIQUE

SAS EFIKA SOLUTIONS

ZA Sainte Anne

85600 La Boissière de Montaigu

contact@efika-solutions.fr

www.efika-solutions.fr



PULVÉRISATION



ENROBAGE
DE SEMENCES

www.efika-solutions.fr

AUJOURD'HUI, DES MICRO-ORGANISMES VIVANTS SONT CAPABLES DE CRÉER UNE FLORE FONGIQUE DE BARRIÈRE BÉNÉFIQUE. CETTE SOLUTION S'APPELLE : TH1110



PULVÉRISATION



ENROBAGE
DE SEMENCES



INTÉRÊTS AGRONOMIQUES

- ◆ TH 1110 va créer une flore fongique de barrière bénéfique. Il va rééquilibrer de façon positive la flore fongique du sol.
- ◆ TH1110 va agir directement sur la croissance des plantes (aérienne et racinaire) en aidant la plante à absorber les nutriments présents dans le sol.
- ◆ TH1110 intervient également dans la biodisponibilité du fer, transformant le FE3+ en FE2+.
- ◆ TH1110 accélère la transformation des matières organiques présentes dans les sols.
- ◆ TH1110 améliore la structure physique des sols (porosité, stabilité structurale...)

UN PROCÉDÉ INNOVANT & HOMOLOGUÉ

Sur céréales à paille, colza, maïs, sorgho, vigne, arboriculture, et cultures légumières.
Composition 100% naturelle.
Utilisation autorisée en Production Biologique conformément au règlement UE2018/848.

CONDITIONS D'APPLICATION

TH1110 se présente sous forme d'une poudre mouillable, à diluer en saupoudrant dans une eau en agitation dans le pulvérisateur. L'application se fait au moment des semis-plantations sur sol humide : en cas de couvert existant (prairie, couvert végétal), appliquer sous la pluie pour que le produit atteigne le sol (possibilité d'utilisation en tant qu'additif agronomique aux engrais minéraux, organiques et amendements, ou enrobage de semences).

AMÉLIORE LA
STRUCTURE DES SOLS

CIRCULATION DE L'EAU
ET AÉRATION

RÉ-ÉQUILIBRE
LA FLORE FONGIQUE DU SOL

AIDE À ABSORBER LES
NUTRIMENTS DU
SOL

